

Amazzonia Arrosto

Inviato da Ilaria D'Aprile
Ultimo aggiornamento giovedì 12 febbraio 2009

Prima si costruisce la strada, successivamente il macello e quindi lo stabilimento di stoccaggio. Così che la foresta Amazzonica in 10 anni ha subito una riduzione pari alla superficie della Grecia. Questo quanto emerge dal report "Amazzonia Arrosto" di Greenpeace sull'impronta ecologica dell'allevamento dei bovini nella regione del Mato Grosso. Come si misura la deforestazione in Amazzonia? L'INPE -Istituto Brasiliano per la ricerca Spaziale- dal 2002 ha elaborato le immagini satellitari digitali che seguono il Programma per la Stima della Deforestazione in Amazzonia generate dai satelliti Landsat. Dalle stime effettuate emerge che la deforestazione annuale dell'Amazzonia segue le fluttuazioni dei prezzi delle merci dei mercati internazionali e in particolare quelli di carne e soia. Non solo. Anche le monocolture di soia provvedono alla riduzione della foresta e all'impovertimento del Mato Grosso. Va ricordato che la foresta Amazzonica non solo regola l'afflusso di piogge del Brasile ma ha un ruolo cruciale nel mantenimento del bilancio climatico a livello globale. Un videoblog di greenpeace per approfondire.